

**TÀI LIỆU TÓM TẮT ATLAS VỀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CỦA
LIÊN ĐOÀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THẾ GIỚI (IDF) ÁN BẢN LẦN THỨ 8**

CẤM CÔNG BỐ ĐẾN 00.01 CET, ngày 14 tháng 11

Gánh nặng Toàn cầu – những thông điệp chính

Năm 2017, IDF ước tính:

- Một trong 11 người trưởng thành (20-79 tuổi) bị đái tháo đường (425 triệu người)
- Một trong 2 người trưởng thành (20-79 tuổi) bị đái tháo đường không được chẩn đoán (trên 212 triệu người)
- 12% chi phí cho y tế của toàn thế giới được chi cho đái tháo đường (727 tỷ USD)
- Một trong 6 trẻ sinh ra (16,2%) bị ảnh hưởng bởi đái tháo đường thai kỳ
- Ba phần tư (79%) số người bị đái tháo đường sống ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình
- 1.106.500 trẻ em và trẻ vị thành niên bị đái tháo đường típ 1

IDF ước tính, năm 2045:

- Một trong 10 người trưởng thành (20-79 tuổi) sẽ bị đái tháo đường (629 triệu người)
- Chi phí y tế liên quan đến đái tháo đường sẽ vượt quá 776 tỷ USD

Thông tin chung	2017	2045
Tổng dân số thế giới	7,5 tỷ	9,5 tỷ
Tổng số người trưởng thành (20-79 tuổi)	4,84 tỷ	6,37 tỷ
Ước tính toàn cầu về bệnh đái tháo đường		
Tỷ lệ hiện mắc (20-79 tuổi)	8,8%	9,9%
Số người bị đái tháo đường (20-79 tuổi)	425 triệu	629 triệu
Số người tử vong do đái tháo đường (20-79 tuổi)	4,0 triệu	-
Tổng chi phí y tế cho đái tháo đường (20-79 tuổi), R=2* 2017 USD	727 tỷ USD	776 tỷ USD
Tăng đường máu ở thai kỳ (20-49 tuổi)		
Tỷ lệ trẻ sinh sống bị ảnh hưởng	16,2%	-
Số trẻ sinh sống bị ảnh hưởng	21,3 triệu	-
Ước tính rối loạn dung nạp glucose		
Tỷ lệ hiện mắc toàn cầu (20-79 tuổi)	7,3%	8,3%
Số người mắc rối loạn dung nạp glucose (20-79 tuổi)	352 triệu	532 triệu
Đái tháo đường típ 1 (0-19 tuổi)		
Số trẻ em và vị thành niên bị đái tháo đường típ 1	1.106.500	-
Số ca mới mắc được chẩn đoán hàng năm	132.600	-

* R=2 ước tính với giả định là chi phí y tế cho người bị đái tháo đường trung bình cao gấp đôi chi phí cho người không bị đái tháo đường.

Số liệu của Atlas về đái tháo đường của IDF xuất bản lần thứ 8 bị cấm công bố đến 00.01 CET thứ Ba ngày 14 tháng 11.

Tỷ lệ hiện mắc đái tháo đường (%) chuẩn hoá theo tuổi (20-79 tuổi) ở từng vùng xếp theo thứ tự bởi IDF

2017			2045		
Thứ tự	Vùng chia theo IDF	Tỷ lệ hiện mắc ĐTD chuẩn hoá theo tuổi	Tỷ lệ mắc ĐTD thô	Tỷ lệ hiện mắc ĐTD chuẩn hoá theo tuổi	Tỷ lệ mắc ĐTD thô
1	Bắc Mỹ và vùng Caribe	11,0%	13,0%	11,1%	14,8%
2	Trung Á và Bắc Phi	10,8%	9,6%	10,8%	12,1%
3	Đông Nam Á	10,1%	8,5%	10,1%	11,1%
4	Tây Thái Bình Dương	8,6%	9,5%	7,4%	10,3%
5	Nam và Trung Mỹ	7,6%	8,0%	7,6%	10,1%
6	Châu Âu	6,8%	8,8%	6,9%	10,2%
7	Châu Phi	4,4%	3,3%	4,3%	3,9%

Các vùng theo IDF – những thông điệp chính

CHÂU PHI:

- Số người bị đái tháo đường dự báo sẽ tăng tới 163% đến năm 2045, mặc dù tỷ lệ hiện mắc đái tháo đường vẫn giữ nguyên ở mức của năm 2017.
- Số người trưởng thành bị rối loạn dung nạp glucose dự báo sẽ tăng tới 154% đến năm 2045.
- Trên 2 trong 3 (69%) người trưởng thành bị đái tháo đường không được chẩn đoán - là con số cao nhất trong các vùng theo IDF.

CHÂU ÂU

- Số trẻ em và trẻ vị thành niên bị đái tháo đường típ 1 cao nhất, với tổng số là 286.000
- Chi phí y tế cho đái tháo đường đạt tới 166 tỷ USD – cao thứ hai trên toàn thế giới

TRUNG Á VÀ BẮC PHI:

- Tỷ lệ hiện mắc đái tháo đường là 10,8% - cao thứ hai trên toàn thế giới.
- Số người bị đái tháo đường dự báo sẽ tăng tới 112% đến năm 2045.

BẮC MỸ VÀ VÙNG CARIBBE:

- Tần suất mắc đái tháo đường (11,0%) và rối loạn dung nạp glucose (14%) đều là cao nhất trên toàn thế giới
- Chiếm tới 52% tổng chi phí toàn cầu (377 tỷ USD), đây là vùng có chi phí y tế cho đái tháo đường cao nhất.

NAM VÀ TRUNG MỸ:

- Tỷ lệ hiện mắc rối loạn dung nạp glucose (IGT) là 9,6% - cao thứ hai trên toàn thế giới
- Đến năm 2045, số người bị đái tháo đường sẽ tăng thêm 2/3 - tăng cao thứ hai trong các vùng theo IDF.

Số liệu của Atlas về đái tháo đường của IDF xuất bản lần thứ 8 bị cấm công bố đến 00.01 CET thứ Ba ngày 14 tháng 11.

ĐÔNG NAM Á:

- 82 triệu người trưởng thành bị đái tháo đường sống ở vùng này - cao thứ hai trong các vùng theo IDF.
- Là nơi cư trú của 19% tổng số người bị đái tháo đường trên thế giới.
- Năm 2017, 1,1 triệu người sẽ tử vong vì đái tháo đường - số tử vong cao thứ hai trong các vùng theo IDF.

TÂY THÁI BÌNH DƯƠNG:

- Là nơi có số người tử vong do đái tháo đường cao nhất trong các vùng theo IDF.
- Khoảng 159 triệu người bị đái tháo đường (37% tổng số) sống ở vùng này - là con số cao nhất trong các vùng theo IDF.

Mười quốc gia/vùng lãnh thổ đứng đầu về số người bị đái tháo đường (20-79 tuổi), năm 2017 và 2045

Thứ tự	Quốc gia/vùng lãnh thổ	Số người bị đái tháo đường năm 2017	Xếp thứ tự	Quốc gia/vùng lãnh thổ	Số người bị đái tháo đường năm 2045
1	Trung quốc	114,4 triệu	1	Ấn độ	134,3 triệu
2	Ấn độ	72,9 triệu	2	Trung quốc	119,8 triệu
3	Hoa kỳ	30,2 triệu	3	Hoa kỳ	35,6 triệu
4	Brazil	12,5 triệu	4	Mexico	21,8 triệu
5	Mexico	12,0 triệu	5	Brazil	20,3 triệu
6	Indonesia	10,3 triệu	6	Ai cập	16,7 triệu
7	LB Nga	8,5 triệu	7	Indonesia	16,7 triệu
8	Ai cập	8,2 triệu	8	Pakistan	16,1 triệu
9	Đức	7,5 triệu	9	Bangladesh	13,7 triệu
10	Pakistan	7,5 triệu	10	Thổ Nhĩ kỳ	11,2 triệu

PHÁT HÀNH CHÍNH THỨC

Ước tính toàn cầu của ấn bản Atlas về Đái tháo đường của IDF lần thứ 8 sẽ được phát hành chính thức vào ngày thứ Ba 14 tháng 11 năm 2017, vào dịp Ngày Đái tháo đường thế giới (WDD). Ấn bản và số liệu đầy đủ sẽ được công bố trực tuyến trên www.diabetesatlas.org.

Atlas về Đái tháo đường của IDF ở Hội nghị của IDF năm 2017

Bản in của Atlas về Đái tháo đường của IDF ấn bản lần thứ 8 sẽ được trưng bày tại Hội nghị của IDF năm 2017 ở Abu Dhabi, Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất, vào thứ Tư ngày 6 tháng 12, lúc 8.00-8.45 trong phiên *Atlas về Đái tháo đường của IDF - Gánh nặng toàn cầu của đái tháo đường*.

Các thông tin chi tiết

Để biết thêm thông tin chi tiết và các số liệu ước tính của từng quốc gia chi tiết, xin truy cập www.diabetesatlas.org hay liên hệ atlas@idf.org.

Để phỏng vấn những người phát ngôn của IDF, xin liên hệ media@idf.org.

Số liệu của Atlas về đái tháo đường của IDF xuất bản lần thứ 8 bị cấm công bố đến 00.01 CET thứ Ba ngày 14 tháng 11.